

Investigating the Effect of Different Concentrations of Murashige and Skoog (MS) Medium and Sucrose on the Production of Potato (*Solanum tuberosum* L.) Microtubers *In Vitro*

F. Yarmohammadi¹, A. Motallebi-Azar², S. Kazemiani³, M. Amani^{4*}

1- M.Sc. Graduate, Bastam Agricultural Jihad Center, Semnan Province, Shahrood, Iran

2, 3 and 4- Associate Professor, M.Sc. Graduate and Ph.D. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran, respectively

(*- Corresponding author's Email: Mina76amani@yahoo.com)

Received: 06-03-2024
Revised: 08-07-2024
Accepted: 18-07-2024
Available Online: 18-07-2024

How to cite this article:

Yarmohammadi, F., Motallebi-Azar, A., Kazemiani, S., & Amani M. (2024). Investigating the effect of different concentrations of Murashige and Skoog (MS) medium and sucrose on the production of potato (*Solanum tuberosum* L.) microtubers *in vitro*. *Journal of Horticultural Science*, 38(4), 745-762. (In Persian with English abstract).
<https://doi.org/10.22067/jhs.2024.87157.1330>

Introduction

Considering the sensitivity of potatoes (*Solanum tuberosum* L.) to viruses, the production of virus-free plants through *in vitro* cultivation and their propagation leads to a reduction in costs and an increase in yield. One of the effective methods of reducing plant diseases and producing disease-free microtubers is the use of *in-vitro* production methods. Considering the role and importance of macro elements and micro elements in the growth of microtubers, it is possible to change the composition of MS culture medium by changing the concentration of salts of macro elements and micro elements without disturbing the balance of elements. This experiment aims to investigate the effect of different concentrations of macro elements (2 Mac, Mac, ½ Mac) and micro elements (2 Mic, Mic, ½ Mic) of MS culture medium in combination with two concentrations of sucrose (80 and 160 g.l⁻¹) was performed on *in vitro* micronodulation of Agria potato.

Materials and Methods

This experiment aimed to investigate the effects of different concentrations of macroelements (2 Mac, Mac, ½ Mac) and microelements (2 Mic, Mic, ½ Mic) in the MS culture medium, combined with two sucrose concentrations (80 and 160 g.l⁻¹), on *in vitro* microtuberization of Agria potato. The study was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications in the plant tissue culture laboratory of the Department of Horticultural Sciences at the Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Lateral buds obtained from *in-vitro* shoots were used as explants and were cultured under sterile conditions on different culture mediums for the purpose of microtuberation, and the cultures were kept in continuous darkness and at a temperature of 18±2°C were kept in the growth room. During one month, Microtuber initiation rate and after two months, microtuber formation characteristics were measured.

Results and Discussion

The results of the analysis of variance showed that the effect of the concentration of micro elements and the interaction effects of micro elements with different concentrations of sucrose and macro elements were significant only in the case of two traits, the percentage and the speed of microtuber initiation, while all microtuber traits productivity was significantly affected by the interaction of micro elements and macro elements. In all culture mediums with 8% sucrose, the initiation percentage of microtubers was 100% and the initiation rate was also maximum. However, the highest percentage of microtuber formation, weight, length, diameter and number of buds on microtuber was obtained in 2Mac culture medium with 16% sucrose. The results showed that the microtuber that



©2024 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/10.22067/jhs.2024.87157.1330>

had more weight and size had a higher percentage of dormancy and the buds on the microtuber were not able to germinate and produce microtuber during the stages of microtuber formation.

Conclusion

For all traits related to microtubers, except for the percentage and speed of microtuber initiation, the effects of microelements, macroelements, and sucrose were not significant. This indicates that the three factors investigated do not independently enhance microtuber formation in the Agria variety. Regarding micronodulation traits, the interaction effect of low-consumption elements with the other two factors was also not significant, suggesting that the concentration of low-consumption elements is not critical for micronodulation in the Agria variety. In all culture media with 8% sucrose, the initiation percentage of microtubers reached 100%, and the initiation speed was at its maximum. However, when the concentration of macroelements was doubled and 16% sucrose was used, both the initiation percentage and speed of microgland formation in the Agria variety showed a significant decrease. The percentage of microtuber formation, weight, length, diameter and number of buds on the microtuber in Agria cultivar were significantly affected by the mutual effect of the concentration of macro elements and sucrose, and the 2 Mac culture medium has 16% sucrose in the first priority and the ½ culture medium Mac with 8 % sucrose in the second priority was better than the other treatments in terms of the investigated traits. In this research, it was found that the produced microglands with greater weight and size had a higher percentage of dormancy and during the stages of microglandogenesis, the buds on the microtubers were not able to germinate and produce microtubers.

Keywords: Agria variety, Macro elements, Micro elements, Microtuber formation, Tissue culture

مقاله پژوهشی

جلد ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۳، ص. ۷۴۵-۷۶۲

بررسی اثر غلظت‌های مختلف محیط کشت موراشیک و اسکوگ (MS) و ساکارز در تولید ریزغده سیب‌زمینی (*Solanum tuberosum* L.) در شرایط درون شیشه‌ای

فهیمه یارمحمدی^۱  - علیرضا مطلبی‌آذر^۲  - سمانه کاظمیانی^۳  - مینا امانی^۴ 

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی افزایش سرعت ریزغده‌زایی و بهبود صفات ریزغده‌زایی، تعیین بهترین غلظت ساکارز (۸۰ و ۱۶۰ گرم در لیتر)، نمک‌های عناصر پرمصرف (2 Mac, Mac, 1/2 Mac) و کم‌مصرف (2Mic, Mic, 1/2 Mic) و غلظت‌های مختلف محیط کشت MS برای بهبود سرعت و کمیت ریزغده‌زایی در سیب‌زمینی (*Solanum tuberosum* L.) رقم آگریا اجرا شد. از جوانه‌های جانبی حاصل از شاخساره‌های درون شیشه‌ای به‌عنوان ریزنمونه استفاده شد و تحت شرایط استریل روی محیط‌های کشت مختلف به‌منظور ریزغده‌زایی کشت شدند و کشت‌ها در تاریکی مداوم و دمای 18 ± 2 درجه سانتی‌گراد در اتاق رشد نگهداری شدند. در طی یک ماه سرعت آغازش ریزغده و پس از گذشت دو ماه صفات ریزغده‌زایی اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت عناصر کم‌مصرف و اثرات متقابل عناصر کم‌مصرف با غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف فقط در مورد دو صفت درصد و سرعت آغازش ریزغده معنی‌دار بوده، درحالی‌که تمامی صفات ریزغده‌زایی از اثر متقابل عناصر کم‌مصرف \times پرمصرف به‌طور معنی‌داری متأثر شدند. در تمامی محیط‌های کشت دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز، درصد آغازش ریزغده‌ها ۱۰۰ درصد و سرعت آغازش نیز حداکثر بود. بالاین‌حال، بالاترین درصد تشکیل ریزغده، وزن، طول، قطر و تعداد جوانه روی ریزغده، در محیط کشت 2Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز به‌دست آمد. نتایج نشان داد که ریزغده‌هایی که وزن و اندازه بیشتری داشتند، از درصد رکود بیشتری برخوردار بودند و جوانه‌های روی ریزغده‌ها طی مراحل ریزغده‌زایی، قادر به جوانه‌زنی و تولید ریزغده نبودند. در همه محیط‌های کشت استفاده شده همراه با ۸۰ گرم در لیتر ساکارز، درصد آغازش ریزغده‌ها ۱۰۰ درصد و سرعت آغازش غده بیشتر بود، ولی زمانی‌که از دوبرابر غلظت عناصر پرمصرف و ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز استفاده شد، درصد آغازش و سرعت آغازش ریزغده کاهش یافت. در این تحقیق مشخص شد که ریزغده‌های تولیدی با وزن و اندازه بیشتر، از درصد رکود بیشتری برخوردار بودند و طی مراحل ریزغده‌زایی، جوانه‌های روی ریزغده‌ها قادر به جوانه‌زنی و تولید ریزغده نبودند.

واژه‌های کلیدی: رقم آگریا، ریزغده‌زایی، عناصر پرمصرف، عناصر کم‌مصرف، کشت‌بافت

مقدمه

می‌شود (Abelenda et al., 2019). میزان استفاده از سیب‌زمینی (*Solanum tuberosum* L.) به‌عنوان غذا در جهان ۳۰ الی ۷۲ درصد می‌باشد (Shahriyar et al., 2015)، اولاً به‌عنوان یک منبع کربوهیدرات و ثانیاً به‌عنوان سبزی استفاده می‌شود، بنابراین سیب‌زمینی از مهم‌ترین سبزیجات در جهان به‌شمار می‌آید. از آنجاکه ازدیاد سیب‌زمینی توسط اندام‌های غیرجنسی (غده‌ها) صورت می‌گیرد، دسترسی به گیاهان و غده‌های سالم و مناسب حائز اهمیت است

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان در سال‌های اخیر، نیاز به مواد غذایی اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی از راه‌های افزایش مواد غذایی، افزایش تولیدات کشاورزی است. سیب‌زمینی با نام علمی (*Solanum tuberosum* L.) یکی از گیاهان تیره Solanaceae به‌دلیل کشت‌وکار آسان به‌عنوان اولین سبزی رایج در جهان کشت

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز جهاد کشاورزی بسطام، استان سمنان، شاهرود، ایران

۲، ۳ و ۴- به‌ترتیب دانشیار، دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

* - نویسنده مسئول: (Email: Mina76amani@yahoo.com)

(Salem & Hassanein, 2017). با توجه به حساسیت سیب‌زمینی به ویروس‌ها، تولید گیاهان عاری از ویروس از طریق کشت درون شیشه‌ای و تکثیر آن‌ها، به کاهش هزینه‌ها و افزایش عملکرد منجر می‌شود (Hannapel, 2007; Igbal et al., 2016). تولید ریزغده در شرایط درون شیشه‌ای اولین بار توسط کشت گره‌های منفرد با جوانه‌های جانبی برای تولید غده بذری عاری از ویروس در سیب‌زمینی صورت گرفت (Haque et al., 2009). این ریزغده‌های عاری از بیماری را می‌توان در تمام طول سال و در هر حجمی تولید کرد (Hannapel, 2007).

عامل‌های مؤثر بر ریزغده‌زایی در شرایط درون شیشه‌ای شامل ژنوتیپ (Ahloowalia, 1999)، نوع ریزنمونه (Khuri & Moorby, 1996)، فتوپریود (Hussey & Stacey, 1984)، دما (Akita & Takayama, 1994)، نوع منبع کربن (Garner & Blake, 1989)، تنظیم‌کننده‌های رشد (Ortiz-Montiel & Lozoya-Saldafia, 1987) و ترکیبات محیط کشت است. غده سیب‌زمینی از نظر گیاهشناسی، ساقه تغییر شکل یافته است. جوانه‌های جانبی در شرایط درون شیشه‌ای به محرک‌های خارجی به‌منظور توسعه شاخساره یا ریزغده‌زایی پاسخ می‌دهند (Afrasiab & Iqbal, 2012). تأمین محیط کشت مناسب برای ادامه رشد ریزغده‌ها ضروری است و به‌نظر می‌رسد که مؤثرترین راه برای رسیدن به ریزغده‌های بزرگ‌تر باشد (Khalafalla et al., 2010). امروزه در دنیا و در کشور ایران، تحقیقات زیادی در ارتباط با ریزازدیادی گیاهانی با ارزش اقتصادی صورت گرفته است (Joshi & Mature, 2015) که در این میان، پژوهش‌هایی نیز بر روند ریزغده‌زایی سیب‌زمینی جهت بهبود کیفیت آن صورت گرفته است (Motallebi-Azar et al., 2011; 2013; Ebadi Khalil et al., 2017; Ashrafzadeh & Leung, 2015; Iranbakhsh, 2011; Snnowald & Snnowald, 2015). تمامی مطالعات، از محیط کشت پایه MS استفاده شده است و تغییری در ترکیبات اصلی این محیط کشت (عناصر پرمصرف و کم‌مصرف) انجام نشده است و با توجه به نقش و اهمیت عناصر پرمصرف و کم‌مصرف در رشد ریزغده‌ها، می‌توان با تغییر غلظت نمک‌های عناصر پرمصرف و کم‌مصرف، بدون برهم‌زدن تعادل عناصر، در ترکیب محیط کشت MS تغییراتی را ایجاد نمود و اثر آن‌ها را روی ریزغده‌زایی بررسی کرد (Yu et al., 2000). در شرایط درون شیشه‌ای، اضافه کردن ساکارز در سطوح بالا به محیط کشت الزامی است تا ریزغده‌زایی صورت بگیرد (Simko, 1994). یو و همکاران (Yu et al., 2000) ساکارز را به‌عنوان منبع کربنی معرفی کردند که برای رشد ریزغده‌ها تقدم بیشتری نسبت به فراورده‌های حاصل از هیدرولیز آن دارد و مقدار ساکارز در دسترس را از عوامل اصلی در تولید ریزغده‌ها دانستند (George, 1993; Karhu, 1997). ساکارز دارای دو نوع نقش در توسعه ریزغده‌ها می‌باشد. نقش اول آن به‌عنوان منبع

کربن است که به‌آسانی توسط گیاهچه‌های درون شیشه‌ای جذب و به نشاسته تبدیل می‌شود. نقش دوم آن در رشدونمو ریزغده است (Yu et al., 2000). هیدرولیز ساکارز منجر به تولید مقادیر برابر گلوکز و فروکتوز می‌شود. در محیط کشت، غلظت گلوکز همیشه کمتر از غلظت فروکتوز است، زیرا سلول‌های سیب‌زمینی تمایل بیشتری برای جذب گلوکز از فروکتوز دارند (Yu et al., 2000). برای رسیدن به اندازه معمول ریزغده، نگهداری غلظت ساکارز در سطح مناسب در طول رشدونمو ریزغده ضروری است (Yu et al., 2000).

برای انجام یک آزمایش موفق و یا تولید و تکثیر گیاه از طریق کشت بافت و ایجاد اندام‌های هوایی نابجا در ریزنمونه‌های کشت شده، ترکیبات محیط کشت نقش اساسی و سرنوشت‌ساز دارد. محیط کشت غذایی، عامل مهم در کشت بافت و سلول به‌شمار می‌رود، آنچه که طراحی محیط کشت را به‌طور خاصی مشکل می‌کند، اثرات متقابل بسیار پیچیده مواد شیمیایی مختلف در یک محیط کشت غذایی مشخص می‌باشد. به‌عنوان مثال، کاربرد بعضی از قندها در محیط کشت سبب کمبود بر می‌شود (George, 1993; Karhu, 1997). همچنین محیط‌های کشت از نظر پتانسیل اسمزی متفاوت می‌باشند. پتانسیل اسمزی محیط‌های کشت مختلف به‌وسیله مواد قابل حل اندازه‌گیری می‌شود که ساکارز و عناصر پرمصرف، بیشترین تأثیر را در پتانسیل اسمزی محیط کشت دارند (George, 1993). این تحقیق به‌منظور افزایش سرعت ریزغده‌زایی و بهبود صفات ریزغده‌زایی، تعیین بهترین غلظت ساکارز، نمک‌های عناصر پرمصرف و کم‌مصرف و غلظت‌های مختلف محیط کشت MS برای بهبود سرعت و کمیت ریزغده‌زایی در رقم آگریا اجرا شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش، در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شده است. در این بررسی از گیاهچه‌های درون شیشه‌ای عاری از ویروس سیب‌زمینی رقم آگریا موجود در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز استفاده شد. برای تهیه محیط کشت، اقدام به تهیه محلول‌های پایه از نمک‌های معدنی و ویتامین‌ها گردید. مواد لازم و مقادیر آن‌ها برای تهیه یک لیتر از محیط کشت MS 1/2 MS و 2MS در جدول ۱ آورده شده است. برای تهیه محیط کشت، مواد لازم به‌صورت هفت محلول ذخیره (استوک) شامل نمک‌های عناصر پرمصرف، نمک‌های عناصر کم‌مصرف، KI و CaCl₂، نمک آهن، نمک مس و مولیبدن و ویتامین‌ها تهیه و در یخچال نگهداری گردید. برای تهیه محیط کشت، مقدار لازم از محلول‌های ذخیره برداشته و همراه با ترکیب عناصر پرمصرف و کم‌مصرف موردنیاز (که به‌صورت ذخیره تهیه شده بود)، به محیط کشت اضافه شد. حجم محلول به ۱۰۰۰ میلی‌لیتر رسانده شد و

اتسمفر به مدت ۲۰ دقیقه شدند. پس از ضدعفونی، محیط‌های کشت تا زمان کشت در شرایط تاریکی نگهداری شدند.

محیط کشت ریزغده‌زایی

برای بررسی ریزغده‌زایی از محیط‌های کشت Mac ۱/۲، Mac ۲، ۱/۲ Mic، Mic، ۲ Mic همراه با دو غلظت ۸۰ و ۱۶۰ گرم ساکارز در لیتر، جمعاً ۱۸ ترکیب استفاده شد (جدول ۲).

بسته به نوع تیمار ساکارز محیط‌کشت، ۸۰ یا ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز به محیط‌کشت اضافه شد. بعد از افزودن مقدار ۰/۱ گرم بر لیتر میواینوزیتول، pH محلول با استفاده از NaOH یا HCl یک نرمال روی ۵/۸ تنظیم گردید. برای جلوگیری از تغییر در pH محیط‌کشت در مدت زمان رشد ریزنمونه‌ها، از ^۱MES به مقدار ۰/۵ میلی گرم در لیتر استفاده شد. برای تهیه محیط جامد، هشت گرم آگار به محیط اضافه شد. پس از حل شدن کامل آگار، در داخل هر ظرف شیشه‌ای، ۳۰ میلی لیتر محیط کشت با استفاده از استوانه مدرج ریخته شد و محیط‌های کشت اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد و فشار یک

جدول ۱- مواد و مقادیر آن‌ها برای تهیه یک لیتر محیط‌کشت

Table 1- Materials and their amounts for preparing one liter of medium

محل ذخیره (استوک) Stock solution	مواد Material	مقادیر اصلی برای تهیه محیط‌کشت 2MS The main values for the preparation of 2MS culture medium (g.l ⁻¹)	مقادیر اصلی برای تهیه محیط‌کشت MS Main values for preparation of MS culture medium (g.l ⁻¹)	مقادیر اصلی برای تهیه محیط‌کشت ۱/۲ MS The main values for the preparation of culture medium 1/2 MS (g.l ⁻¹)
نمک‌های عناصر ماکرو Macro elements	NH ₄ NO ₃	3.3	1.65	0.825
	KNO ₃	3.8	1.9	0.95
	MgSO ₄ .7H ₂ O	0.74	0.37	0.185
	KH ₂ PO ₄	0.34	0.17	0.085
نمک‌های عناصر میکرو Micro elements	MnSO ₄ .4H ₂ O	0.046	0.023	0.0115
	ZnSO ₄ .7H ₂ O	0.0172	0.0086	0.0043
	H ₃ BO ₃	0.0124	0.0062	0.0031
	Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O	0.0005	0.00025	0.000125
	CuSO ₄ .5H ₂ O	0.00005	0.000025	0.0000125
	CoCl ₂ .6H ₂ O	0.00005	0.000025	0.0000125
کلسیم Calcium	CaCl ₂ .2H ₂ O	0.88	0.44	0.22
ید Iodine	KI	0.00166	0.00083	0.000415
ویتامین Vitamin	Nicotinic acid	0.0005	0.0005	0.0005
	Thiamin.HCl	0.0005	0.0005	0.0005
	Pyridoxine.HCl	0.0001	0.0001	0.0001
	Glycine	0.002	0.002	0.002
آهن Iron	FeSO ₄ . 7H ₂ O	0.0556	0.0278	0.0139
	Na ₂ EDTA.2H ₂ O	0.0672	0.0336	0.0168

جدول ۲- غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف و کم‌مصرف در تیمارهای مورد بررسی

Table 2- Different concentrations of Macro and Micro elements in the investigated treatments

تیمار Treatment	یک دوم میکرو 1/2 Mic	یک برابر میکرو Mic	دو برابر میکرو 2 Mic
نصف ماکرو 1/2 Mac	1/2 Mac × 1/2 Mic	1/2 Mac × Mic	1/2 Mac × 2 Mic
یک برابر ماکرو Mac	Mac × 1/2 Mic	Mac × Mic (control)	Mac × 2 Mic
دو برابر ماکرو 2 Mac	2 Mac × 1/2 Mic	2 Mac × Mic	2 Mac × 2 Mic

کشت ریزنمونه‌ها

برای کشت ابتدا گیاهچه‌ها از داخل شیشه کشت در زیر هود لامینار خارج شده و سپس روی کاغذ صافی استریل شده قرار گرفتند. با استفاده از اسکالپل در زیر هود، قلمه‌های تک گره از وسط شاخساره به طول تقریبی یک سانتی‌متر تهیه شد. در مرحله بعد، ریزنمونه‌ها در محیط کشت، شامل غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و ساکارز به‌طور عمودی با رعایت قطبیت قرار داده و در شرایط تاریکی کامل با دمای 18 ± 2 درجه سانتی‌گراد به مدت دو ماه نگهداری شدند.

اندازه‌گیری صفات

زمان آغازش ریزغده (مشاهده تورم جوانه جانبی به اندازه دو میلی‌متر)، هر هفته به مدت یک ماه یادداشت‌برداری گردید. بعد از تشکیل ریزغده و رشد کافی، دو ماه بعد از کشت، اندازه‌گیری‌های درصد آغازش و تشکیل ریزغده، قطر، طول، وزن، تعداد جوانه رشدیافته روی ریزغده و رکود ریزغده‌ها (تعداد ریزغده دارای جوانه رشدیافته در هر واحد آزمایشی بر تعداد کل ریزغده)، به عنوان شاخصی از تولید ریزغده ثبت شد. درصد تشکیل ریزغده (قطر بیش از پنج میلی‌متر) با شمارش تعداد ریزنمونه‌هایی که ریزغده تولید کرده بودند، نسبت به تعداد کل ریزنمونه‌ها برآورد گردید. برای تعیین درصد آغازش ریزغده با قطر حدود دو میلی‌متر نیز به همین ترتیب عمل شد. قطر و طول ریزغده‌ها به وسیله خط کش و وزن ریزغده با ترازوی حساس (0.001 گرم) اندازه‌گیری شد.

سرعت آغازش ریزغده

$$\text{سرعت آغازش} = \frac{(n_1 \times t_1) + \dots + (n_n \times t_n)}{t_n} \quad (1)$$

که در آن، n : تعداد ریزغده آغازش شده و t : روز می‌باشد. برای اندازه‌گیری سرعت آغازش ریزغده هر شش روز یک‌بار تعداد ریزغده آغازش شده شمارش شد.

استفاده از ریزغده به عنوان واحد تکثیر

گلدان‌های دارای پیت، ورمی‌کولایت و پرلایت به نسبت ۱:۱:۱ در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد و فشار یک اتمسفر به مدت ۲۰ دقیقه اتوکلاو شدند. سپس سیستم میست در اتاق کشت راه‌اندازی شد. ریزغده‌ها از محل میان گره در زیر هود لامینار بریده شده و به گلدان‌ها انتقال داده شدند و سپس آبیاری و به زیر سیستم میست با دمای 25 ± 2 درجه سانتی‌گراد در شرایط ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی منتقل گردیدند و به مدت یک ماه در این شرایط نگهداری شدند. پس از چهار الی شش روز، گیاهچه‌ها سبز شدند. در طول نگهداری در شرایط آزمایشگاه، هفته‌ای دو مرتبه محلول غذایی ۱۰ برابر رقیق شده MS به منظور رشد بهتر گیاهچه‌ها، به گیاهان داده شد.

علاوه بر این، جهت تهیه مجدد ریزنمونه جهت کشت (در صورت نیاز)، ریزغده‌ها پس از برداشت، به محیط کشت MS فاقد تنظیم‌کننده‌های رشد منتقل شده و در اتاق رشد در دمای 25 ± 2 درجه سانتی‌گراد (فوتوپریود ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی) قرار گرفتند. پس از شش الی هفت روز، ریزغده‌ها جوانه زده و برای تهیه گیاهچه‌های درون شیشه‌ای قابل استفاده بودند.


تجزیه و تحلیل داده‌ها

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار چهار نمونه اجرا شد. بررسی فرضیات تجزیه واریانس برای تمامی صفات مورد اندازه‌گیری نشان داد که فرضیات تجزیه واریانس (به خصوص همگنی واریانس و عدم ارتباط بین واریانس و میانگین) برای تمامی صفات برقرار بوده و نیازی به تبدیل داده و یا هر روش دیگری که باعث برقراری فرضیات تجزیه واریانس شود نبوده و بنابراین، تجزیه واریانس داده‌ها و همبستگی خطی بین صفات با استفاده از نرم‌افزار SPSS ver.21 انجام شد. مقایسات میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چنددامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام و نمودارها با نرم‌افزار Excel ترسیم شد. در این نمودارها، مقدار عددی بار روی هر ستون نشان‌دهنده انحراف استاندارد میانگین تیمار موردنظر می‌باشد.

نتایج و بحث

فرآیند آغازش و ریزغده‌زایی

نخستین آغازش ریزغده، چهار روز پس از کشت جوانه جانبی، در محیط کشت MS با نصف عناصر پرمصرف دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز مشاهده شد (داده‌ها نشان داده نشده است). البته در برخی از ریزنمونه‌ها، ریزغده‌های آغازش‌یافته، رشد نکرده (اندازه کمتر از دو میلی‌متر) و بنابراین، جوانه‌های جانبی شروع به رشد کرده (شکل ۱-الف) و در چنین نمونه‌هایی، ریزغده‌ای تشکیل نشد. بعد از دو ماه، طول شاخه‌های رشدیافته از محل گره بین یک الی ۲۵ سانتی‌متر بود (شکل ۲) که در برخی ریزنمونه‌ها، شاخه‌های رشدیافته، تولید شاخه جانبی کردند (شکل ۳). در اکثر تیمارها، ریزغده‌های آغازش شده، رشد کرده و طی دو ماه، اندازه آن‌ها از دو الی نه میلی‌متر متغیر بود (شکل ۱-ب). کشت تعدادی از ریزغده‌های تولیدی روی محیط کشت MS بدون هورمون نشان داد که جوانه‌های موجود روی ریزغده‌ها پس از پنج الی هفت روز شروع به رشد کرده و پس از یک ماه گیاهان درون شیشه‌ای مطلوب را تولید کردند (شکل ۴). برخی از ریزنمونه‌ها هیچ ریشه‌ای تولید نکردند، ولی اکثر ریزنمونه‌ها دارای یک الی ۱۶ عدد ریشه بودند که طول آن‌ها بین ۰/۵ الی ۲۰ سانتی‌متر متغیر بود (شکل ۵).



شکل ۱- پاسخ جوانه جانبی به تیمارهای ریزغده‌زایی در سیب‌زمینی رقم آگریا (الف) عدم رشد ریزغده آغازش‌یافته و (ب) ریزغده رشد‌یافته
Figure 1- Lateral bud response to micronodulation treatments for potato cv. Agria a) lack of microgland development and b) Microgland developed



شکل ۲- رشد شاخساره سیب‌زمینی رقم آگریا از محل گره به طول ۲۵ سانتی‌متر
Figure 2- 25 cm long shoot growth from the node location of potato cv. Agria



شکل ۳- رشد شاخساره‌های در سیب‌زمینی رقم آگریا از محل گره
Figure 3- The growth of potato cv. Agria shoots from the location of the node



شکل ۴- تولید گیاهچه‌های درون شیشه‌ای از ریزغده سیب‌زمینی رقم آگریا
Figure 4- Production of *in vitro* seedlings from microgland of potato cv. Agria




شکل ۵- ریشه‌های رشد‌یافته از ریزنمونه به طول یک الی ۲۰ سانتی‌متر در سیب‌زمینی رقم آگریا
Figure 5- The roots grown from the explant with a length of 1 to 20 cm in potato cv. Agria

درصد آغازش ریزغده

آغازش ریزغده در محیط کشت MS (تغییرنیافته) و در تغییر یافته‌های آن (هشت محیط کشت) مشاهده شد، اما زمان آغازش و درصد آغازش وابسته به نوع محیط کشت و غلظت ساکارز بود. نخستین آغازش ریزغده چهار الی پنج روز پس از کشت جوانه‌های جانبی در محیط کشت MS با نصف عناصر پرمصرف به همراه ۸۰ گرم در لیتر ساکارز مشاهده شد و به طور متوسط در سایر محیط‌های کشت ۱۴ الی ۱۶ روز پس از کشت، آغازش ریزغده شروع شد. غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی‌داری روی درصد آغازش ریزغده داشتند، اما اختلاف معنی‌داری بین غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف از نظر درصد آغازش ریزغده مشاهده شد. اثر متقابل $Mac \times Suc$ بر روی درصد آغازش ریزغده معنی‌دار بود، در حالی که سایر اثرات متقابل ($Mac \times Mic$) ($Suc, Mic \times Suc, Mac \times Mic$) بر درصد آغازش ریزغده تأثیر معنی‌داری نداشتند (جدول ۳). در این آزمایش در محیط‌های کشت دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز و با افزایش غلظت عناصر پرمصرف، درصد آغازش ریزغده تغییر نکرد و آغازش ریزغده در این تیمارها، ۱۰۰ درصد بود، ولی هنگامی که از ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز استفاده گردید با افزایش غلظت عناصر پرمصرف، کاهش معنی‌داری در درصد آغازش ریزغده‌ها مشاهده شد. حداقل درصد آغازش ریزغده، در محیط کشت 2Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز مشاهده گردید. فشار اسمزی در غلظت ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز برای ریزغده‌زایی مناسب بوده و امکان جذب مواد غذایی توسط سلول‌های گیاهی و آغازش ریزغده وجود دارد. احتمالاً افزایش غلظت عناصر پرمصرف و ساکارز، فشار اسمزی را بالاتر از حد بهینه برده و این امر نتیجه معکوس در پی داشته است. همچنین ممکن است کاهش غلظت عناصر، باعث رقیق شدن محیط کشت و جذب راحت‌تر آب و مواد غذایی توسط گیاه گردد. به نظر می‌رسد که افزایش فشار اسمزی در حد بهینه، سبب تحریک و افزایش رشدونمو شده و پس از رسیدن به

یک حد بهینه رشد و شکل‌گیری اندام، بر اثر توقف جذب آب متوقف می‌شود. از طرف دیگر، با کاهش غلظت عناصر پرمصرف به $1/2 Mac$ در هر دو غلظت ساکارز، آغازش ریزغده‌ها ۱۰۰ درصد بود، بنابراین می‌توان گفت که غلظت ۸۰ گرم در لیتر ساکارز و $1/2 Mac$ از نظر درصد آغازش ریزغده و جنبه اقتصادی مناسب‌تر از سایر تیمارها می‌باشد. در محیط کشت $1/2 Mac$ ، آغازش غده در *Gloriosa rothschildiana* بالاتر از محیط کشت Mac بود (Kozak, 2003). گزارشات قبلی نیز بر این امر تأکید دارد که برای ریزغده‌زایی باید غلظت‌های ساکارز را مورد بررسی قرار داد (Seabrook et al., 2004; Hussain et al., 2006). کارلسون و همکاران (Carlson et al., 2004) گزارش کردند که بهترین محیط کشت برای القاء ریزغده، محیط کشت MS همراه با ۸۰ گرم در لیتر ساکارز می‌باشد. غلظت ۸۰ گرم در لیتر ساکارز در مقایسه با غلظت ۴ و ۱۲ گرم در لیتر ساکارز سبب افزایش در آغازش ریزغده‌ها گردید (Garner & Blake, 1989).

آغازش ریزغده در غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف از ۹۵/۰۸ تا ۹۸/۱۱ درصد متغیر بود و از نظر آماری تفاوتی بین غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف وجود نداشت (شکل ۶). بنابراین، برای آغازش ریزغده از جوانه جانبی، نیاز به مقادیر کمتر عناصر کم‌مصرف ($1/2 Mac$) می‌باشد. این امر نشان داد که برای آغازش ریزغده‌ها، مقدار عناصر کم‌مصرف بحرانی نبوده و آغازش ریزغده وابسته به عناصر کم‌مصرف نمی‌باشد. احتمال می‌رود که حتی در مقادیر پایین‌تر عناصر کم‌مصرف نیز آغازش ریزغده مشاهده شود. همچنین مقادیر عناصر کم‌مصرف روی فشار اسمزی محلول بی‌تأثیر بوده و چون آغازش ریزغده عمدتاً وابسته به فشار اسمزی است، بنابراین با دو برابر کردن مقادیر عناصر Mic ، فشار اسمزی در حد ناچیز افزایش پیدا کرده که همراه با تأمین بهتر مواد غذایی لازم برای سلول‌های تحریک شده، باعث مقداری افزایش در درصد آغازش ریزغده شده است. قندها و عناصر پرمصرف، بیشترین تأثیر را در پتانسیل اسمزی کل محیط کشت دارند (George, 1993).



شکل ۶- درصد آغازش ریزغده سیب‌زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 6- The microtuber initiation of potato cv. Agriain different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)

جدول ۳- تجزیه واریانس اثر عوامل مورد بررسی بر صفات مورد مطالعه سیب‌زمینی رقم آگریا
Table 3- ANOVA for the effect of the studied factors on the studied traits of potato cv. Agria

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی df	میانگین مربعات Mean square								تعداد شاخه Number of shoot	تعداد جوانه روی ریزغده Number of buds per microtuber	وزن ریزغده Microtuber weight	قطر ریزغده Microtuber diameter	طول ریزغده Microtuber length	سرعت آغازش ریزغده Microtuber initiation rate	تشکیل ریزغده Microtuber formation	آغازش ریزغده Microtuber initiation	رکود Dormancy		
عناصر پرمصرف Mac	2																			818.36 ^{ns}
عناصر کم‌مصرف Mic	2																			228.89 ^{ns}
ساکارز Suc	1																			1143.95 ^{ns}
عناصر پرمصرف × عناصر کم‌مصرف	4																			510.42 ^{ns}
Mac × Mic																				
عناصر پرمصرف × ساکارز Mac × Suc	2																			606.97 ^{ns}
عناصر کم‌مصرف × ساکارز Mic × Suc	2																			95.07 ^{ns}
عناصر پرمصرف × عناصر کم‌مصرف × ساکارز Mac × Mic × Suc	4																			1209.61 ^{ns}
خطا Error	33																			1002.21


^{ns}, **, and *: بن‌ترتیب عدم معنی‌داری، معنی‌داری در سطح احتمال یک و پنج درصد
^{ns}, **, and *: non-significant, and significant at $p \leq 0.01$ and $p \leq 0.05$, respectively

درصد تشکیل ریزغده

در اکثر تیمارها و ریزنمونه‌ها، پس از آغازش ریزغده‌ها در محل گره، ریزغده‌ها در طی دو ماه تشکیل شدند (شکل ۷-ب). باین‌حال، در تیمارهایی که به دلیل شرایط نامناسب، ریزغده‌های آغازش یافته رشد نکرده بودند، جوانه‌های جانبی شروع به رشد کرده و ریزغده‌ای در محل گره تولید نشد (شکل ۷-الف). در محیط کشت MS (شاهد)، میانگین تشکیل ریزغده برابر ۲۳/۳۵ درصد و در محیط‌های کشت MS تغییر یافته ۲۷/۲۳ درصد بود (شکل ۸). اختلاف معنی‌داری بین غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف، عناصر کم‌مصرف و ساکارز از نظر درصد تشکیل ریزغده وجود نداشت. باین‌حال، درصد تشکیل ریزغده به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر اثر متقابل $Mac \times Suc$ قرار گرفت، درحالی‌که سایر اثرات متقابل دوگانه و سه‌گانه معنی‌دار نبودند (جدول ۳). حداقل درصد تشکیل ریزغده در غلظت ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز، در محیط کشت $Mac \frac{1}{2}$ حاصل شد و با افزایش غلظت عناصر پرمصرف، درصد تشکیل ریزغده نیز به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. به‌طوری‌که درصد تشکیل ریزغده در $Mac \frac{1}{2}$ ۳۶ درصد و در 2Mac، ۷۱ درصد بود. بنابراین، در محیط کشت حاوی ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز، اضافه کردن عناصر پرمصرف باعث افزایش معنی‌داری در تشکیل ریزغده شد. حداقل درصد تشکیل ریزغده در محیط کشت MS (شاهد) دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز نسبت به $Mac \frac{1}{2}$ از درصد تشکیل ریزغده کمتری برخوردار بود؛ لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در رقم آگریا محیط کشت MS تغییر یافته ($Mac \frac{1}{2}$) دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز، باعث بهبود تشکیل ریزغده می‌شود. از طرف دیگر، محیط کشت 2 Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر از درصد تشکیل ریزغده بالایی برخوردار بود. باین‌حال، برای کاهش هزینه‌ها، محیط کشت $Mac \frac{1}{2}$ دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز نسبت به سایر تیمارها ترجیح داده می‌شود. به کار بردن غلظت شش الی ۱۰ گرم در لیتر ساکارز سبب تشکیل ریزغده گردید (Bhojwani & Razdan, 1996). آلتیندال و کارادوگان (Altindal & Karadogan, 2011) نشان دادند که نوع منبع کربن و غلظت به کار رفته برای هر رقم متفاوت می‌باشد، به‌طوری‌که محیط کشت پایه MS دارای شش گرم در لیتر ساکارز در رقم آگریا و چهار درصد مالتوز در رقم جاستین، بهترین محیط‌های کشت برای ریزغده‌زایی بودند. در غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف، درصد تشکیل ریزغده از ۴۹ تا ۶۰ درصد متغیر بود و از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف مشاهده نشد. بنابراین، استفاده از غلظت‌های بالا یا پایین عناصر کم‌مصرف بر تشکیل بهینه ریزغده اثری نداشته و می‌توان از غلظت پایین عناصر کم‌مصرف استفاده نمود.


سرعت آغازش ریزغده

در هر محیط کشت، شروع ریزغده‌زایی از یک ریزنمونه به ریزنمونه دیگر متفاوت بود. همچنین اختلاف زمانی بین شروع ریزغده‌زایی در ریزنمونه‌های کشت شده در یک محیط کشت وجود داشت، به‌طوری‌که در برخی از ریزنمونه‌ها چهار الی پنج روز بعد از کشت، آغازش ریزغده مشاهده شد و در تعداد دیگری از ریزنمونه‌ها پس از ۱۴ الی ۱۶ روز آغازش ریزغده شروع شد. اختلاف معنی‌داری بین دو غلظت ساکارز از نظر سرعت آغازش ریزغده وجود داشت، درحالی‌که سرعت آغازش ریزغده تحت تأثیر غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف و پرمصرف قرار نگرفت. از بین اثرات متقابل، فقط اثر متقابل $Mac \times Suc$ تأثیر معنی‌داری روی سرعت آغازش ریزغده داشت. این نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف و کم‌مصرف نتوانست به‌طور معنی‌داری سرعت آغازش ریزغده‌ها را تغییر دهد. باین‌حال، زمانی که غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف را به همراه درصدهای مختلف ساکارز در نظر بگیریم، سرعت آغازش ریزغده‌ها از اثر توأم این دو فاکتور به‌طور معنی‌داری متأثر شدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که کمترین سرعت آغازش ریزغده مربوط به محیط کشت 2Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز بود. سایر تیمارها از سرعت آغازش ریزغده مناسب و حداکثری برخوردار بودند. این امر احتمالاً به این خاطر می‌باشد که در محیط کشت 2 Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز، فشار اسمزی بالا، باعث تأخیر در آغازش ریزغده‌ها شده که نهایتاً پس از یک ماه، درصد آغازش ریزغده در این تیمار نسبت به سایر تیمارها کمتر بود. این درحالی است که فشار اسمزی بالا در بهبود تشکیل ریزغده‌ها مؤثر می‌باشد (شکل ۹). لذا محیط کشت 2 Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز برای تشکیل ریزغده تیمار مناسبی است، هرچند که از سرعت آغازش پایین‌تری برخوردار باشد. ساکارز یکی از محرک‌های بحرانی برای تشکیل ریزغده است و به‌عنوان یک منبع رطوبت بذر و منبع انرژی و نیز در غلظت‌های بالاتر به‌عنوان سیگنالی برای تشکیل ریزغده ضروری است (Hussain et al., 2006). یو و همکاران (Yu et al., 2000) گزارش کردند که سرعت رشد ریزغده‌ها در غلظت ۸۰ گرم در لیتر ساکارز خیلی بالاتر از زمانی بود که از چهار گرم در لیتر ساکارز در محیط کشت استفاده شد. سرعت آغازش ریزغده در غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف از ۲/۸۷۷ تا ۳/۲۹۵ متغیر بود. باین‌حال، از نظر آماری تفاوتی بین غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف وجود نداشت. به دلیل اینکه سرعت آغازش ریزغده عمدتاً وابسته به فشار اسمزی است و عناصر کم‌مصرف نقش بارزی در فشار اسمزی ندارند، بنابراین با دو برابر کردن مقادیر Mic، مواد غذایی بیشتری تأمین خواهد شد و باعث مقداری افزایش در سرعت آغازش ریزغده شده است.




شکل ۷- فرآیند ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم آگریا پس از دو ماه: الف- عدم رشد ریزغده آغازش یافته و تبدیل شدن به شاخه ب- ریزغده رشد یافته

Figure 7- The process of microtuber formation of potato cv. Agria after two months: A- The lack of developed microtuber and B- Developed microtuber



شکل ۸- درصد تشکیل ریزغده سیب‌زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 8- The percentage of microtuber formation of potato cv. Agria in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)



شکل ۹- سرعت آغازش ریزغده سیب‌زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 9- The microtuber initiation rate per day of potato cv. Agria in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)

طول ریزغده

در تیمارهای مورد بررسی، طول ریزغده از دو الی نه میلی متر متغیر بود (شکل ۱۰). طول ریزغده تحت تأثیر غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف، عناصر کم‌مصرف و ساکارز قرار نگرفت. به غیر از اثر متقابل $Mac \times Suc$ ، سایر اثرات متقابل روی طول ریزغده تأثیر معنی داری نداشتند. طولی ترین ریزغده با میانگین $4/2$ میلی متر در محیط کشت 2Mac دارای 160 گرم در لیتر ساکارز مشاهده شد، ولی اختلاف معنی داری با محیط کشت تغییر نیافته Mac تکمیل شده با 160 گرم در لیتر ساکارز نداشت، تغییر غلظت عناصر پرمصرف به $1/2$ Mac، سبب کاهش طول ریزغده (به کمترین مقدار، $2/1$ میلی متر)، در بین تیمارهای به کار رفته شد. در غلظت 80 گرم در لیتر ساکارز، طول ریزغده با کاهش غلظت عناصر پرمصرف، از 2 Mac به Mac ثابت مانده و سپس در $1/2$ Mac افزایش نشان داد، ولی این افزایش معنی دار نبود (شکل ۱۱). با توجه به نقش عناصر پرمصرف می توان چنین استنباط کرد که یونی مانند یون کلسیم که در محیط کشت به صورت نمک کلرید کلسیم وجود دارد، علاوه بر نقش‌های متعددی مانند حضور در ساختمان و پروتئین‌های غشاء سلولی و تیغه میانی دیواره سلولی و ساخت سلولز، فعال کننده تعدادی از آنزیم‌های مسئول تقسیم سلولی و طولی شدن سلول می باشد (Shacklock et al., 1992; Jones, 1998; Mengel & Kirby, 1987). نیتروژن نیز برای ساختن اسید آمینه تربیتوفان (ماده اولیه برای ساخت اکسین) لازم می باشد (George, 1993)، با کاهش غلظت این عناصر در محیط کشت، سنتز اکسین که یکی از وظایف آن طولی شدن و توسعه سلولی است، کاهش می یابد. در نتیجه، رشد سلول ها با کاهش غلظت عناصر پرمصرف کاهش می یابد و سبب کاهش طول ریزغده می شود و با توجه به اینکه ریزغده یک اندام ذخیره ای برای نشاسته می باشد، به مقادیر ساکارز بالاتری نیاز دارد، بنابراین با افزایش غلظت ساکارز می توان انتظار داشت که ریزغده های بزرگتری تولید شود. طول ریزغده در غلظت‌های مختلف عناصر کم مصرف از $1/7$ تا $2/3$ میلی متر متغیر بود. با این حال، از نظر آماری اختلاف معنی داری بین غلظت‌های مختلف عناصر کم مصرف مشاهده نشد و می توان چنین استنباط کرد که طول ریزغده مستقل از اثرات عناصر کم مصرف بوده و وابستگی زیادی به غلظت‌های ساکارز و عناصر پرمصرف دارد. در کل، در صورت بهینه بودن سایر عوامل مؤثر در ریزغده زایی، غلظت‌های بالای ساکارز می تواند در تولید و رشد ریزغده های بزرگتر مفید باشد (Yu et al., 2000; Shibli et al., 2001).

قطر ریزغده

قطر ریزغده تحت تأثیر فاکتورهای مورد مطالعه قرار نگرفت، ولی اثر متقابل دوگانه $Mac \times Suc$ تأثیر معنی داری روی قطر ریزغده


داشت. قطر ریزغده از $1/7$ الی چهار میلی متر متغیر می باشد و این امر نشان داد که در محیط‌های کشت مورد استفاده، قطر ریزغده مناسبی به دست آمده است. با این حال، قطورترین ریزغده‌ها در محیط کشت 2 Mac که با 160 گرم در لیتر ساکارز تکمیل شده بود، به دست آمد. این در حالی است که قطر ریزغده‌ها در محیط کشت MS (شاهد) در هر دو غلظت ساکارز و نیز در محیط کشت $1/2$ Mac تکمیل شده با 80 گرم در لیتر ساکارز بیشتر بود. در دو محیط کشت (محیط کشت 2Mac همراه با 80 گرم در لیتر ساکارز و نیز محیط کشت $1/2$ Mac به همراه 160 گرم در لیتر ساکارز)، قطر ریزغده‌ها کم تر بود (شکل ۱۲). ریزغده‌ها یک منبع با ارزش برای نگهداری ژرم پلاسما سیب زمینی می باشند. در تحقیقی که روی شش ژنوتیپ مختلف سیب زمینی انجام گردید، مشخص شد که فقط ریزغده‌هایی با قطر بیش از پنج میلی متر توانستند بعد از سه سال انبارداری، بقاء خود را حفظ نمایند. از طرفی دیگر، روند تولید ریزغده وابسته به غلظت ساکارز بود، به طوری که در محیط‌های کشت دارای 160 گرم در لیتر ساکارز با افزایش غلظت عناصر پرمصرف، افزایش در قطر ریزغده‌ها مشاهده شده و برعکس زمانی که محیط کشت دارای 80 گرم در لیتر ساکارز بود، کاهش در غلظت عناصر پرمصرف باعث افزایش قطر ریزغده‌ها گردید. قطر ریزغده‌ها در غلظت‌های مختلف عناصر کم مصرف از $2/47$ تا $3/11$ میلی متر متغیر بود و با کاهش غلظت عناصر کم مصرف، افزایش ناچیزی در قطر ریزغده‌ها مشاهده شد، ولی اختلاف معنی داری بین $1/2$ Mic و 2Mic وجود نداشت و می توان از غلظت پایین عناصر کم مصرف استفاده نمود. در میان سه غلظت مختلف ساکارز (صفر، شش و هشت گرم در لیتر) بزرگترین ریزغده تولیدی ($4/3$ میلی متر) در محیط کشت شش گرم در لیتر ساکارز همراه با 12 گرم در لیتر BAP مشاهده گردید (Imani et al., 2010).

تعداد جوانه روی ریزغده

سیب زمینی از جمله محصولات می باشد که توسط اندام رویشی تکثیر می گردد و با توجه به اینکه ریزغده یک اندام برای تکثیر می باشد، با افزایش تعداد جوانه روی ریزغده، محصول بیشتری تولید خواهد شد. با اعمال تیمارهای مختلف، تعداد جوانه روی ریزغده‌ها بین یک الی نه جوانه متغیر بود. تعداد جوانه روی ریزغده، از غلظت‌های مختلف عناصر کم مصرف، پرمصرف و ساکارز متأثر نگردید. از طرف دیگر، تعداد جوانه تحت تأثیر اثر متقابل $Mac \times Suc$ قرار گرفت و سایر اثرات متقابل بر تعداد جوانه معنی دار نبودند. تعداد جوانه روی ریزغده به غلظت‌های عناصر پرمصرف و ساکارز وابسته بود، به طوری که بالاترین تعداد جوانه ($4/231$) روی هر ریزغده زمانی به دست آمد که ریزغده‌ها در محیط کشت 2Mac دارای 160 گرم در لیتر ساکارز قرار گرفتند، در صورتی که در محیط کشت 2Mac دارای


بیشتر از دو عدد نبودند. از آنجایی که افزایش تعداد جوانه روی ریزغده، منجر به افزایش عملکرد ریزغده در محصول می‌شود، بنابراین استفاده از تیمارهایی با غلظت بالاتر ساکارز و عناصر پرمصرف مناسب‌تر می‌باشد. در غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف، تعداد جوانه روی ریزغده از $\frac{2}{4}$ تا $\frac{3}{2}$ عدد متغیر بود، ولی از نظر آماری تفاوتی بین غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف مشاهده نگردید. بنابراین، استفاده از غلظت‌های بالا یا پایین عناصر کم‌مصرف بر تشکیل تعداد جوانه اثری نداشته و می‌توان از غلظت پایین عناصر کم‌مصرف استفاده نمود.

۸۰ گرم در لیتر ساکارز، کمترین تعداد جوانه ($\frac{1}{509}$) مشاهده گردید. در محیط‌کشت Mac متوسط، تعداد ریزغده در ۱۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز بیشتر از ۸۰ گرم در لیتر ساکارز بود، ولی اختلاف معنی‌داری بین دو غلظت ۸۰ و ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز مشاهده نگردید (شکل ۱۳). در محیط‌کشت Mac $\frac{1}{2}$ ، متوسط تعداد جوانه روی ریزغده در ۸۰ گرم در لیتر ساکارز بالاتر از ۱۶۰ گرم در لیتر بود، ولی اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. این نتایج نشان داد که محیط‌کشت تغییر یافته 2Mac دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز و Mac $\frac{1}{2}$ دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز، تحت این شرایط قادر به تولید ریزغده‌هایی با تعداد جوانه



شکل ۱۰- طول ریزغده (راست) و قطر ریزغده (چپ) در سیب‌زمینی رقم آگریا

Figure 10- Microtuber length (right) and the microtuber diameter of (left) of potato cv. Agria



شکل ۱۱- طول ریزغده سیب‌زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 11- The microtuber length of potato cv. Agria in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)

خواب، عامل محدودکننده در استفاده از ریزغده‌ها به‌عنوان بذر گواهی شده می‌باشد که برای کوتاه کردن کارهای کشت بافت، عدم وجود رکود مفید است (Leclerc & Donnelly, 1995). عوامل متعددی از قبیل ژنوتیپ، اندازه ریزغده، مدت زمان قرار گرفتن ریزغده‌ها در محیط‌کشت، تنظیم‌کننده‌های رشد، بلوغ جوانه و سطح داخلی ABA

رکود


در تعدادی از ریزغده‌های تولیدی در محیط‌های کشت مورد بررسی، جوانه‌های موجود روی ریزغده، شروع به رشد کردند و این امر نشان داد که این ریزغده‌ها فاقد رکود بودند. رشد جوانه به‌دلیل نداشتن دوره خواب در ریزغده‌های تولیدی اتفاق می‌افتاد. عدم وجود دوره

2Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز به دست آمد و با توجه به اینکه در این محیط کشت، میزان غده تشکیل شده حداکثر بوده، طبیعی است که تعداد شاخه حداقل باشد (شکل ۱۴). گزارش‌ها نشان داد که سطوح کم ساکارز (سه گرم در لیتر) در محیط کشت ریزغده‌زایی، شاخساره‌های طبیعی را تولید می‌کنند و هیچ ریزغده‌ای تشکیل نشد. بنابراین، سطوح کم ساکارز مسئول رشد رویشی شاخساره در سیب‌زمینی هستند (Hussain *et al.*, 2006; Khuri & Moorby, 1995). پژوهش‌های فوجینو و همکاران (Fujino *et al.*, 1995) نشان داد که افزایش ساکارز از سه به هشت گرم در لیتر، سبب توقف تولید شدن شاخه‌ها و متورم شدن ناحیه زیر هر یک از شاخه‌ها می‌شود. تتسومورا و همکاران (Tetsumura *et al.*, 2008) گزارش کردند که کاهش در غلظت محیط کشت MS سبب افزایش تشکیل ریشه و شاخه در *Vaccinium corymbosum* گردید.

بر خواب ریزغده‌ها اثر می‌گذارند (Hemberg, 1985). تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به درصد رکود ریزغده‌ها نشان داد که اثرات ساده و متقابل فاکتورهای مورد مطالعه روی درصد رکود ریزغده‌ها معنی‌دار نبودند، لذا غلظت‌های مختلف عناصر پرمصرف، عناصر کم‌مصرف و ساکارز، رکود یکسانی را ایجاد کردند و به‌طور متوسط ۷۳/۶۵ درصد ریزغده‌ها، دارای رکود بودند.


تعداد شاخه رشدیافته از محل گره

شاخساره‌های رشدیافته، دارای طولی بین یک الی ۲۵ سانتی‌متر بودند که گاهی روی شاخساره اصلی، شاخساره‌های جانبی نیز تشکیل شد. تعداد شاخه رشدیافته از محل گره تحت تأثیر اثر متقابل ساکارز و عناصر پرمصرف قرار گرفت. کمترین تعداد شاخساره در محیط کشت




شکل ۱۲- قطر ریزغده سیب‌زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 12- The microtuber diameter of potato cv. Agria in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)



شکل ۱۳- تعداد جوانه سیب‌زمینی رقم آگریا روی هر ریزغده در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 13- The number of buds on per microtuber of potato cv. Agria in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)




شکل ۱۴- تعداد شاخه سیب‌زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 14- The shoot number of potato cv. Agria in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)

می‌باشد. اثر غلظت محیط کشت پایه روی جنین‌زایی سوماتیکی در مارچوبه بررسی شد و نتایج نشان داد که غلظت‌های محیط‌کشت پایه، روی رشد شاخساره‌ها تأثیر معنی‌داری داشت، علاوه‌براین، وزن تر شاخساره‌ها در تیمار 2MS دوبرابر MS بود (Mamiya & Sakamoto, 1999). بررسی روند تغییرات وزن ریزغده‌ها نشان داد که وزن ریزغده‌ها در محیط‌های کشت دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز با افزایش غلظت عناصر پرمصرف افزایش نشان داد. این درحالی است که در محیط‌های کشت دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز، کاهش معنی‌داری در وزن ریزغده‌ها با افزایش غلظت عناصر پرمصرف مشاهده شد. به عبارت دیگر، زمانی که غلظت عناصر پرمصرف افزایش می‌یابد، برای به‌دست آوردن ریزغده‌های با وزن بالا، بایستی غلظت ساکارز افزایش یابد تا علاوه‌بر تأمین مواد معدنی، انرژی لازم برای تجمع مواد نشاسته‌ای در ریزغده‌ها نیز فراهم شود. علت پایین بودن وزن ریزغده‌ها در ۸۰ گرم در لیتر ساکارز یا در غلظت‌های پایین‌تر از ۸۰ گرم در لیتر، می‌تواند به این دلیل باشد که در محیط‌کشت، ساکارز به‌راحتی به گلوکز و فروکتوز تجزیه شده و طی ۳۰ روز پس از کشت، قسمت اعظمی از ساکارز جذب و مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا برای مرحله رشد و بزرگ شدن ریزغده‌ها، منبع کربن ناچیزی باقی خواهد ماند، ولی با افزایش غلظت ساکارز، می‌توان انتظار داشت که منبع کربن کافی برای بزرگ شدن ریزغده وجود داشته باشد. وزن ریزغده از ۲۰/۵ میلی‌گرم تا ۲۴/۷۲ میلی‌گرم در غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف، متغیر بود، ولی از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید، به‌طوری‌که در رابطه با عناصر کم‌مصرف، اختلاف معنی‌داری بین محیط‌کشت MS و تغییر یافته‌ها وجود نداشته و به‌نظر می‌رسد که غلظت ۱/۲ Mic می‌تواند نیازهای رشد سلول‌های ریزغده را فراهم سازد، پس می‌توان از محیط‌کشت MS یا تغییر یافته آن استفاده نمود، ولی با توجه به هزینه‌ها، محیط‌کشت دارای ۱/۲ Mic توصیه می‌شود.

وزن ریزغده‌ها

وزن ریزغده‌ها، به‌عنوان یک عامل اصلی در تولید غده محسوب می‌شود، به‌طوری‌که ریزغده‌هایی با وزن کم، گیاهچه‌هایی با تعداد غده کمی تولید خواهند کرد (Donnelly *et al.*, 2003). بنابراین، بهینه‌سازی شرایط تولید ریزغده می‌تواند بر عملکرد مزرعه‌ای سیب‌زمینی تأثیرگذار باشد (Dwiati & Anggorowati, 2011). در این آزمایش، وزن ریزغده‌ها بین هفت تا ۱۰۳ میلی‌گرم متغیر بود که نشان‌دهنده بالا بودن وزن ریزغده‌های تولیدی از وزن تعریفی برای ریزغده‌ها می‌باشد. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که غلظت‌های مختلف عناصر کم‌مصرف، پرمصرف و ساکارز تأثیر معنی‌داری بر وزن ریزغده نداشتند. این امر نشان می‌دهد که وزن ریزغده‌ها از اثرات انفرادی فاکتورهای مورد مطالعه متأثر نشد. با این حال، اثر متقابل $Mac \times Suc$ روی وزن ریزغده معنی‌دار بود، این درحالی است که سایر اثرات متقابل دوگانه و سه‌گانه بر وزن ریزغده معنی‌دار نبودند. وزن ریزغده در محیط‌کشت 2Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز، تقریباً دو برابر محیط‌کشت MS (شاهد) دارای ۸۰ یا ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز بود که این امر نشان‌دهنده بهبود عوامل تغذیه‌ای با دو برابر کردن غلظت عناصر پرمصرف می‌باشد. از طرف دیگر، با کاهش غلظت عناصر پرمصرف نسبت به محیط‌کشت MS (شاهد)، کاهش در وزن ریزغده‌ها در محیط‌کشت دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز مشاهده گردید که نشان‌دهنده برهم‌خوردن تعادل بین مواد معدنی و غلظت منبع کربن می‌باشد (شکل ۱۵). برهم‌خوردن تعادل مواد معدنی و منبع کربن در تیمار دیگری نیز مشاهده گردید. به‌طوری‌که در محیط‌کشت تغییر یافته 2Mac، دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز، وزن ریزغده دو برابر محیط‌کشت 2Mac، دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز بود. بنابراین، غلظت‌های بالای ساکارز در ریزغده‌زایی و افزایش وزن ریزغده‌ها مؤثر



شکل ۱۵- وزن ریزغده سیب زمینی رقم آگریا در غلظت‌های مختلف ساکارز و عناصر پرمصرف

Figure 15- The weight of the potato cv. Agria microtuber in different concentrations of sucrose and macro elements (DMRT, $p \leq 0.05$)

لازم است که بالا بودن این صفات مدنظر باشد (داده‌ها نشان داده نشده است).

نتیجه‌گیری

در این مطالعه، محیط کشت 2Mac دارای ۱۶۰ گرم در لیتر ساکارز در اولویت اول و محیط کشت 1/2 Mac دارای ۸۰ گرم در لیتر ساکارز در اولویت دوم به علت تولید ریزغده‌های با وزن بالا و تعداد بیشتر جوله روی ریزغده به عنوان تیمار برتر پیشنهاد می‌شود. ریزغده‌های تولیدی با وزن و اندازه بیشتر، از درصد رکود بیشتری برخوردار بودند و طی مراحل ریزغده‌زایی، جوله‌های روی ریزغده‌ها قادر به جوله‌زنی و تولید ریزغده نبودند. همچنین با توجه به تأثیر مواد آلی بر فرآیندهای ریخت‌زایی، پیشنهاد می‌شود که اثر نوع و غلظت ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و افزودنی‌های آلی روی فرآیند ریزغده‌زایی بررسی شود.

ضریب همبستگی بین وزن ریزغده با صفات مورد اندازه‌گیری نشان داد که وزن ریزغده با تعداد شاخساره‌های تولیدی از جوانه جانبی رابطه منفی و معنی‌داری داشت. به عبارت دیگر، در محیط‌های کشتی که جوانه جانبی قادر به رشد و تولید شاخساره‌های جدید نبود، وزن ریزغده‌ها بالاتر بود. این امر نشان می‌دهد که هر ترکیب از عناصر پرمصرف و کم‌مصرف و نیز غلظت ساکارز و یا هر عامل دیگری که بتواند از رشد طولی شاخساره تولیدی از جوانه جانبی جلوگیری کند، می‌تواند باعث تشکیل ریزغده و در نهایت، منجر به تولید ریزغده‌های با وزن بالا گردد. از طرف دیگر، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین وزن ریزغده با طول، قطر، درصد تشکیل ریزغده و تعداد جوانه روی ریزغده وجود داشته و در ریزغده‌ها و محیط‌های کشتی که طول، قطر و وزن ریزغده‌ها و تعداد جوانه روی ریزغده‌ها بالا بود، ریزغده‌های با وزن بالا تولید شد. این امر نشان می‌دهد که عوامل مشترکی روی این صفات تأثیرگذار می‌باشند. لذا در انتخاب محیط کشت مناسب،

References

- 1- Abelenda, J.A., Bergonzi, S., Oortwijn, M., Sonnewald, S., Du, M., Visser, R.G., & Bachem, C.W. (2019). Source-sink regulation is mediated by interaction of an FT homolog with a SWEET protein in potato. *Current Biology*, 29, 1178-1186. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.02.018>
- 2- Afrasiab, H., & Iqbal, J. (2012). Biochemical and molecular characterization of somaclonal variants and induced mutants of potato. *Pakistan Journal of Botany*, 44, 1503-1508.
- 3- Ahloowalia, B.S. (1999). Minitubers for seed potato production. *Farm and Food*, 4, 4-6.
- 4- Akita, M., & Takayama, S. (1994). Induction and development of potato tubers in a jar fermentor. *Plant Cell Tissue Organ Culture*, 36, 177-182. <https://doi.org/10.1007/BF00037717>
- 5- Altindal, D., & Karadogan. (2011). The effect of carbon sources on *in vitro* microtubertization of potato (*Solanum tuberosum* L.). *Turkish Journal of Field Crops*, 15, 7-11.
- 6- Ashrafzadeh, S., & Leung, D.W.M. (2015). Microtuber formation in potato callus. *ScienceAsia*, 41, 1-4.
- 7- Bhojwani, S.S., & Razdan, M.K. (1996). Plant tissue culture: theory and practice, a revise edition Elsevier, 501 p.
- 8- Carlson, C., Groza, H.I., & Jiang, J. (2004). Induction of *in vitro* minimum potato plant growth and microtubertization. *American Journal of Potato Research*, 81, 50-58.

- 9- Donnelly, D.J., Coleman, W.K., & Coleman, S.E. (2003). Potato microtuber production and performance: A review. *American Journal of Potato Research*, 80, 103-115. <https://doi.org/10.1007/BF02870209>
- 10- Dwiati, M., & Anggorowati, S. (2011). Induction of *in vitro* culture of potato microtuber by using alar and dark photoperiod application. *Agrivita, Journal of Agricultural Science*, 33, 47-52. <https://doi.org/10.17503/agrivita.v33i1.38>
- 11- Ebadi, M., & Iranbakhsh, A. (2011). The induction and growth of potato (*Solanum tuberosum* L.) microtubers (sante cultivar) in response to the different concentrations of 6-benzylaminopurine and sucrose. *African Journal of Biotechnology*, 10, 10626-10635. <https://doi.org/10.5897/AJB11.047>
- 12- Fujino, K., Koda, Y., & Kikuta, Y. (1995). Reorientation of cortical microtubules in the sub-apical region during tuberization in single-node stem segments of potato in culture. *Plant and Cell Physiology*, 36, 891-895. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a078835>
- 13- Garner, N., & Blake, J. (1989). The induction and development of potato microtubers *in vitro* on media free of growth regulating substances. *Annals of Botany*, 63, 663-674. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a087795>
- 14- George, E.F. (1993). *Plant propagation by tissue culture. part I. The technology Exegetics England. Potato*. Ph.D. Thesis, Punjab Agricultural University Ludhiana India. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5005-3_8
- 15- Hannapel, D.J. (2007). *Signaling the Induction of Tuber Formation*. In: Vreugdenhil D (Ed.), *Potato Biology and Biotechnology*. Elsevier B.V, 242-243. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-044451018-1/50054-3>
- 16- Haque, A.V., Samad, M.A., & Shapla, T.L. (2009). *In vitro* callus initiation and regeneration of potato. *Bangladesh Journal of Agricultural Research*, 34, 449-456. <http://dx.doi.org/10.3329/bjar.v34i3.3971>
- 17- Hemberg, T. (1985). *Potato rest*. In: *Potato Physiology*. P.H. Li (Ed). Academic Press Inc, Orlando, Fla. U.S.A. 354-388.
- 18- Hussain, I., Chaudhry, Z., Muhammad, A., Asghar, R., Naqvi, S.M.S., & Rashid, H. (2006). Effect of chlorocholine chloride, sucrose and BAP on *in vitro* tuberization in potato (*Solanum tuberosum* L. cv. Cardinal). *Pakistan Journal of Botany*, 38, 275-282. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26159.89763>
- 19- Hussey, G., & Stacey, N.J. (1984). Factors affecting the formation of *in vitro* tubers of potato (*Solanum tuberosum* L.). *American Potato Journal*, 53, 565-578. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a086720>
- 20- Imani, A.A., Qhrmanzadeh, R., Azimi, J., & Janpoor, J. (2010). The effect of various of 6-benzylaminopurine (BAP) and sucrose on *in vitro* potato (*solanum tuberosum* L.) microtuber induction. *American-Eurasian Journal Agriculture and Environ. Science*, 8, 457-459.
- 21- Iqbal, A.A., Rizwan, A., Mukhtar, Z., Mansoor, S., Mehmood, Z., & Asad, S. (2016). Establishment of an efficient and reproducible regeneration system for potato cultivars grown in Pakistan. *Pakistan Journal of Botany*, 48, 285-290.
- 22- Jones, J.B. (1998). *Plant Nutrition Manual*. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. p. 149.
- 23- Joshi, A., & Mature, N. (2015). Micropropagation and conservation of endanger medicinal plant – *Leptadenia rtilolata* (Retz.) wight and Arn. tought nodal explant. *International Journal of Current Advanced Research*, 4, 382-385.
- 24- Karhu, S.T. (1997). Sugar use in relation to shoot induction by sorbitol and cytokinin in apple. *Journal American Society Horticulture Science*, 122, 476-480. <https://doi.org/10.21273/JASHS.122.4.476>
- 25- Khalafalla, M.M., Abd Elaleem, K.G., Rasheid, S., & Modawi, R.S. (2010). Callus formation and organogenesis of potato (*Solanum tuberosum* L.) cultivar almera. *Journal of Phytology*, 2, 40-46.
- 26- Khalil, M.M., Abd El Aal, A.M.H., & Samy, M.M. (2017). Studies on microtuberization of five potato genotypes. *Egyptian Journal of Horticulture*, 44, 91-97. <http://dx.doi.org/10.21608/ejoh.2017.1176.1011>
- 27- Khuri, S., & Moorby, J. (1995). Investigations into the role of sucrose in potato cv. Estima microtuber production *in vitro*. *Annal of Botany*, 75, 295-303. <https://doi.org/10.1006/anbo.1995.1024>
- 28- Kozak, D. (2003). Effect of medium components on *in vitro* tuberization of *Gloriosa rothschildiana* óbrien. *Acta Horticultur*, 624, 515-520. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.624.71>
- 29- Leclerc, Y., & Donnelly, D.J. (1995). Microtuber dormancy in three potato cultivars. *American Potato Jornal*, 2, 215-223. <http://dx.doi.org/10.1007/BF02855037>
- 30- Mamiya, K., & Sakamoto, Y. (1999). Effect of sugar concentration and strength of basal medium on conversion of somstic embryos in *Asparagus Officinalis* L. *Scientia Horticulture*, 84, 15-26. [http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00098-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00098-9)
- 31- Mengel, K., & Kirby, E.A. (1987). Principles of plant nutrition. International patash institute. *Worblaufen Bern, Switzerland*, 7(12), 687-695. <http://dx.doi.org/10.1093/aob/mch063>
- 32- Motallebi-Azar, A., Kazemiani, S., & Yarmohamadi, F. (2013). Effect of sugar/osmotica levels on *in vitro* microtuberization of potato (*Solanum tuberosum* L.). *Russian Agricultural Sciences*, 39, 112-116. <https://doi.org/10.3103/S1068367413020146>
- 33- Motallebi-Azar, A., Kazemiani, S., Kiumarsie, F., & Mohaddes, N. (2011). Shoot proliferation from node explants of potato (*Solanum tuberosum* cv. Agria). II. effect of different concentrations of NH₄NO₃, hydrolyzed casein and BAP. *Romanian Biotechnological Letters*, 16, 6181-6186.

- 34- Ortiz-Montiel, G., & Lozoya-Saldafia, H. (1987). Potato minitubers: Technology validation in Mexico. *American Potato*, 64, 535-544. <http://dx.doi.org/10.1007/BF02853752>
- 35- Salem, J., & Hassanein, A.M. (2017). In vitro propagation, microtuberization, and molecular characterization of three potato cultivars. *Biologia Plantarum*, 61, 427-437. <https://doi.org/10.1007/s10535-017-0715-x>
- 36- Seabrook, J.E.A., Douglass, L.K., & Arnold, D.A. (2004). Effect of leaves on microtubers produced from potato single-node cutting *in vitro*. *American Journal of Potato Research*, 81, 1-5. <https://doi.org/10.1007/BF02853830>
- 37- Shacklock, P.S., Read, N.D., & Trewavas, A.J. (1992). Cytosolic free calcium mediates redlight induced photomorphogenesis. *Nature*, 358, 753-755. <https://doi.org/10.1038/358753a0>
- 38- Shahriyar, S., Akram, S., Khan, K., Miya, F., & Sarkar, A.R. (2015). *In vitro* plant regeneration of potato (*Solanum tuberosum* L.) at the rate of different hormonal concentration. *Asian Journal of Medical and Biological Research*, 1, 297-303. <http://dx.doi.org/10.3329/ajmbr.v1i2.25625>
- 39- Shibli, R.A., Abu-Ein, A.M., & Ajlouni, M.M. (2001). *In vitro* and *in vivo* multiplication of virus free "Spunta" potato. *Pakistan Journal. Botanica*, 33, 35-41. <https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54133>
- 40- Simko, I. (1994). Sucrose application causes hormonal changes associated with potato tuber induction. *Journal Growth Regulator*, 13, 73-77. <https://doi.org/10.1007/s10725-004-5827-6>
- 41- Sonnewald, S., & Sonnewald, U. (2014). Regulation of potato tuber sprouting. *Planta*, 239, 27-38. <https://doi.org/10.1007/s00425-013-1968-z>
- 42- Tetsumura, T., Matsumoto, Y., & Sato, M. (2008). Evaluation of basal media for micropropagation of four highbush blueberry cultivars. *Science Horticulture*, 119, 72-84. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2008.06.028>
- 43- Yu, W.C., Joyce, P.J., Cameron, D.C., & McCown, B.H. (2000). Sucrose utilization during potato microtuber growth in bioreactors. *Plant Cell Reports*, 19, 407-413. <http://dx.doi.org/10.1007/s002990050748>